


БРУЦЕЛЛЕЗ

зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, которая характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.



Основными источниками бруцеллёзной инфекции для людей является мелкий, крупный рогатый скот и свиньи. Чаще всего заболевание развивается у мясников, ветеринаров, охотников, пастухов, доярок и людей других профессий, связанных с животноводством.

Бактерии выделяются во внешнюю среду не только во время окота или отёла, но и с молоком, мочой, испражнениями.

Возбудитель бруцеллёза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе хранящихся в холодильниках и морозильных камерах. Но малоустойчив к высоким температурам,

в жидкой среде погибает при температуре + 60*С, через 30 минут, при температуре + 80-85* С — через 5 минут, при кипячении – моментально.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА БРУЦЕЛЛЕЗОМ:

- **контактный** - при уходе за больными животными, при убое и разделке туш, при обработке сырья животного происхождения;
- **алиментарный** - при употреблении в пищу сырого молока (изделий из него) и мяса, полученных от больных животных и не прошедших достаточную термическую обработку;
- **аэрогенный** – при вдыхании пыли, содержащей бактерии.

Симптомы

заболевания:

- **ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
- **СЛАБОСТЬ**
- **ПОТЛИВОСТЬ ИЛИ ОЗНОБ**
- **ГОЛОВНАЯ БОЛЬ**
- **БОЛЬ В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ**
- **СЫПЬ**
- **УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ**



Профилактика:

не приобретать мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты на несанкционированных рынках и с рук;

употреблять в пищу мясо, молоко, мясные и молочные продукты, прошедшие достаточную термическую обработку;

при уходе за сельскохозяйственными животными использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты – маски, резиновые перчатки.

**Соблюдение указанных рекомендаций позволит предотвратить заражение
бруцеллёзом.**

г. Шклов 2024, тираж 50 экз.