

## ОСТОРОЖНО – ДИФТЕРИЯ!

**Дифтерия** - это токсикоинфекция, возбудитель которой, выделяет токсин, поражающий ткани на месте инфицирования. Токсин вызывает проблемы с дыханием, вызывая воспаления слизистой оболочки носа и горла, поражает сердце, нервную систему и почки.

**Возбудитель заболевания** - дифтерийная палочка, которая хорошо сохраняется в окружающей среде. Так, в воде и молоке она жизнеспособна 7 дней; на игрушках, белье, книгах, посуде - нескольких недель. Все дезинфицирующие средства (перекись водорода, хлорамин и т.п.) в обычных концентрациях убивают дифтерийную палочку. Под действием прямых солнечных лучей она погибает через несколько часов.

**Источник инфекции** – больной дифтерией человек или носитель.

**Путь передачи** - воздушно-капельный (при чихании, кашле, в разговоре), воздушно-пылевой (через загрязнённые бактериями поверхности)

**Инкубационный период** заболевания составляет от 2 до 10 дней.



**Дифтерия характеризуется следующими симптомами:**

- интоксикация (лихорадка, утомляемость, общая слабость);
- боль в горле при глотании;
- отечность миндалин с характерным налетом (поражённая ткань образует серые пленки);
- осиплость голоса, сухой кашель, затруднённое дыхание;
- выделения из носа;
- отечность шеи.

**При первых признаках заболевания необходимо вызывать врача на дом.** Отделить его от остальных членов семьи, выделить ему отдельную посуду, полотенце. Посуду мыть отдельно горячей водой с мылом. Комнату, где находится больной, необходимо проветривать и убирать влажным способом. Госпитализировать больного дифтерией необходимо обязательно для проведения специального лечения, спасения жизни больного и изоляции его от восприимчивых к дифтерии лиц.

**ПРОФИЛАКТИКА.** Для предупреждения заболеваний дифтерией необходимо делать профилактические прививки. Детей прививают, начиная с раннего возраста вакциной Эупента, в состав которой входит противодифтерийный компонент, трехкратно, затем проводится ревакцинация в 18 месяцев вакциной АКДС, в 6 лет вакциной АДС-м, в 11 лет вакциной АДм, в 16 лет вакциной АДСм. Прививку от дифтерии взрослым проводят комбинированной вакциной АДС-М каждые 10 лет.

**ПОМНИТЕ ОБ ОПАСНОСТИ ДИФТЕРИИ!**

**БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!  
СВОЕВРЕМЕННО ДЕЛАЙТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ  
ПРОТИ ДИФТЕРИИ!**