

ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ



Пневмококковая инфекция - группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых пневмококком, она является одним из самых распространенных заболеваний на земном шаре и одной из распространенных причин заболеваемости и смертности у детей до пяти лет и пожилых лиц.

Почему пневмококк так опасен? Потому как у детей иммунная система еще несовершенна, а у пожилых лиц с возрастом увеличивается число сопутствующих заболеваний.

Пневмококковая инфекция может проявляться в виде пневмонии, гнойного менингита, бронхита, отита, артрита.

Источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя. Наиболее опасны носители, так как они, не имея симптомов заболевания, могут заражать окружающих. Наиболее опасен пневмококк для детей возрастной группы от 0 до 2 лет и для взрослых со слабым иммунитетом.

Передается инфекция воздушно-капельным путем. Инкубационный период (с момента заражения до развития болезни) составляет от 1 до 3 дней.

Симптомы пневмококковой пневмонии включают лихорадку, кашель, одышку и боль в груди. При пневмококковом гнойном менингите - ригидность затылочных мышц, лихорадка, спутанность сознания, нарушение ориентации, светобоязнь.

Самым эффективным способом предупредить развитие пневмококковой инфекции является вакцинация.

В нашей стране, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Республики Беларусь, первая вакцинация детей проводится в 2 месяца, вторая в 4 месяца, ревакцинация против пневмококковой инфекции в возрасте - 12 месяцев.

Другие категории граждан могут получить прививку на платной основе, обратившись к участковому врачу УЗ «Шкловская ЦРБ».

Уважаемые родители, проявите заботу о своих детях – своевременно выполняйте прививки против пневмококковой инфекции!